

HOKOEX®

Stosowanie produktu HOKOEX w chlewniach.



1. Obiekty z systemem głębokiej ściółki

Najlepiej stosować **HOKOEX** trzy dni po usunięciu obornika lub zwierząt z pomieszczeń inwentarskich.

Produkt **HOKOEX** należy nanieść na całą powierzchnię zabrudzoną obornikiem. Zastosuj go również w miejscach mokrych oraz wokół karmideł i poideł.

Proces należy powtarzać każdorazowo po usunięciu obornika lub po ponownym pojawieniu się larw much.



2. Stosowanie w chlewniach z pełnym systemem rusztowym

Zastosować **HOKOEX** na całej powierzchni podłogi rusztowej bezpośrednio po usunięciu zanieczyszczeń. Aplikować produkt w narożnikach gdzie obornik ma tendencję do zalegania.



3. Chlewnie częściowo wyposażone w system podłóg rusztowych

Zastosuj **HOKOEX** na powierzchni podłogi rusztowej oraz wokół poideł i karmideł gdzie obornik oraz pasza mają tendencję do zalegania.

Kontroluj pomieszczenia pod kątem pojawiających się larw much. Kiedy larwy pojawią się, ponownie zastosuj **HOKOEX** jak najszybciej. Zazwyczaj odstępy między zabiegami wynoszą dwanaście tygodni.

Pamiętaj, że na rozwój much wpływa przede wszystkim temperatura i wilgotność.

Nie stosować bezpośrednio na zwierzęta.
Przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety.



www.vetfeed.eu
tel. 698941740

HOKOEX®

Produkt idealny do zwalczania uciążliwych larw much w systemach hodowli zwierząt.

VETFEED



DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Hokoex, Hoko, the OKO device are trade marks or registered trade marks of Hokochemie GmbH, Switzerland.

HOKOEX Dla hodowców trzody chlewnej / 20.01.2022 / PL



BRAK MUCH – BRAK ZMARTWIEŃ

Muchy na fermach świń są nie tylko uciążliwe, ale także przenoszą choroby powodując dalsze straty w produkcji.

Intensywna produkcja trzody chlewnej samoistnie staje się atrakcyjnym miejscem dla obecności much, które składają jaja w produkowanym oborniku. Tylko część populacji dorosłych much / osobników jest widoczna podczas gdy główna ich populacja przechodzi różne stadia rozwoju w zalegającym oborniku.

Hokoex zawiera sprawdzony regulator wzrostu, który ingeruje w rozwój w poszczególnych stadiach larwalnych i zapobiega dojrzewaniu do dorosłej postaci muchy, przerywając w ten sposób cykl rozwojowy owadów.

**Przerwij cykl :
Nie ma larw –
Nie ma much**



Tylko niewielka część much jest obecna w postaci dorosłych owadów.

Przytłaczająca ich ilość jest ukryta w oborniku jako jaja, larwy lub poczwarki.

Miejsca wymagające użycia HOKOEX

- Pod balustradami / przy wygradzeniach
- Pod korytami gdzie pasza jest powszechnie rozsypany
- Pod poidłami oraz wokół nich
- Wokół filarów / podciągów
- Wokół ścian okalających pomieszczenia z podłogą rusztową
- Narożniki oraz krawędzie kojców
- Zbiorniki na gnojowicę
- Odpływy zanieczyszczone obornikiem oraz tereny przylegające do gospodarstwa

Zasady stosowania HOKOEX

System All-in, all-out (Pełne / Puste)


Stosować bezpośrednio po czyszczeniu i / lub usunięciu gnojowicy. Użyć produkt bezpośrednio przed wprowadzeniem zwierząt. Rozsypanie granulatu **HOKOEX** jest ogólnie preferowaną metodą stosowania ze względu na łatwość aplikacji.

Aplikowanie **HOKOEX** za pomocą konewki lub opryskiwaczy niskociśnieniowych daje identyczne efekty.

System produkcji ciągłej

Idealnym rozwiązaniem jest usunięcie gnojowicy z kanału gnojowego. W przeciwnym razie może dojść do zaschnięcia wierzchniej warstwy gnojowicy, gdzie tworzy się twarda skorupa. W takim przypadku należy zastosować **HOKOEX** poprzez oprysk lub polewanie.

Monitoruj ponowne pojawienie się larw much. Jako że rozwój much jest uzależniony od elementów tj. prawidłowe zarządzanie obornikiem oraz warunków klimatycznych tj. temperatura oraz wilgotność. Przy tak odpowiednio spełnionych warunkach możemy stosować **HOKOEX** w odstępach od dwóch do trzech tygodni lub tylko dwa razy do roku.



Korzyści ze stosowania środka larwobójczego HOKOEX

- Redukcja populacji much poniżej poziomu uciążliwości dla :
 - Żywego inwentarza
 - Pracowników ферmy
 - Producentów drobiu
- Proste zastosowanie nie wymagające dużego nakładu pracy
- Długie przerwy pomiędzy aplikacjami HOKOEX
- Nie są wymagane żadne dalsze środki do zwalczania owadów dorosłych much
- Poprawa bioasekuracji poprzez redukcję chorób przenoszonych przez muchy
- Zapobieganie stratom ekonomicznym

Metody aplikacji

Produkt **HOKOEX** można aplikować w prosty sposób poprzez rozsypanie granulatu, polewanie lub użyć w postaci oprysku (spray) po uprzednim rozpuszczeniu produktu. W przypadku, gdy powierzchnia obornika jest sucha należy użyć **HOKOEX** w postaci oprysku lub polewania.

Skuteczność jest niezależna od metody zastosowania produktu. Wszystkie obszary gdzie larwy mogą się rozwijać lub ich jaja mogą być złożone powinny zostać poddane działaniu produktu **HOKOEX**. Obejmuje to sprzęt do usuwania zanieczyszczeń jak również miejsca wokół poidel, gdzie ściółka może pozostawać wilgotna.



HOKOEX®

Cyromazyna 2%

